

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

349

新竹市衛生局 函

地址：30041新竹市中央路241號10樓

承辦人：鄭小姐

電話：03-5355191-189

傳真：03-5355317

電子信箱：h71309@hcchb.gov.tw

30050

新竹市民主路160號4樓之3

受文者：新竹市藥師公會

發文日期：中華民國104年11月24日

發文字號：衛食藥字第1040023050號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

104年12月1日			
批閱	理事長	常務理事	常務理事

批閱公告本會會員知悉藥品濫用通報

總幹事陳來元

理事長壽偉瑾

主旨：鑑於藥物濫用嚴重影響民眾健康，惠請貴會轉知所屬會員辦理管制藥品濫用通報相關事宜，請查照。

說明：

- 一、為掌握我國藥物濫用現況及趨勢，即時防範，防止其危害擴大，惠請轉知所屬會員，對毒品危害防制中心每月轉介之就醫個案，經醫師診斷為藥物濫用者，務必及時通報至本署「管制藥品濫用通報系統」(網址：<http://dars.fda.gov.tw>)。另，對自願前往旨揭機構就醫之個案，亦請該機構，務必確實通報。
- 二、檢附藥物濫用通報及愷他命危害預防宣導之文章及刊物等資料(如附件)，請協助轉知轄區醫療院所及藥癮戒治機構，加強醫護人員對藥物濫用通報及愷他命危害認知等訊息，並協助轉載於院內相關刊物及講習資料以強化防制宣導，若發現有因藥物濫用而就醫之個案，務必通報至本署通報系統(網址：<http://dars.fda.gov.tw>)。

正本：新竹市醫師公會、新竹市藥師公會、新竹市藥劑生公會、新竹市牙醫師公會

副本：本局食品藥物管理科

局長何秉聖

本案依分層負責規定授權業務主管決行



食品藥物管理署

Food and Drug Administration

愷他命相關法規與規定

食品藥物管理署 管制藥品組

愷他命於91年公告列為第三級毒品及管制藥品，如為醫藥及科學使用為管制藥品，醫藥使用須符合管制藥品管理條例、藥事法、醫療法等相關法規，非法使用即為毒品。

依管制藥品管理條例之規定，從事第三級管制藥品愷他命輸出、輸入、製造、販賣、購買之機構業者，須領有管制藥品登記證，並將管制藥品置於營業處所，設置專櫃加鎖儲藏，且須於營業處所設置簿冊，詳實登載管制藥品之每日收支結存情形，並定期申報；醫師、牙醫師使用愷他命須開立管制藥品專用處方箋，獸醫師、獸醫佐則須有診療紀錄，且非為正當醫療目的，不得使用，醫藥教育研究試驗人員非經衛生署核准之正當教育研究試驗，亦不得使用。前述規定皆為防止醫藥科學上使用之管制藥品，流供非法使用或遭濫用。

愷他命非法使用則為第三級毒品，製造、運輸、販賣者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣700萬元以下罰金；意圖販賣而持有者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金；以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用者，處5年以上有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金；引誘他人施用者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金；轉




藥求安全·食在安心

食品藥物管理署 Food and Drug Administration

讓者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以下罰金；無正當理由持有或施用者，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下之毒品危害講習；持有純質淨重20公克以上者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以下罰金。惟因愷他命近年來濫用情形嚴重，行政院院會已通過修法，提高製造、運輸、販賣第三級毒品刑責，以遏止其濫用趨勢。(註：毒品危害防制條例於104年2月4日修正，並自公布日施行，本文業已同步修正。)

摘自：管制藥品簡訊第54期(網址：<http://www.fda.gov.tw/TC/PublishOtherMessage.aspx>)





食品藥物管理署 Food and Drug Administration

多元化愷他命濫用危害預防宣導

行政院衛生署食品藥物管理局 管制藥品組

依據司法檢調機關緝獲毒品資料統計，愷他命自95年起，緝獲量已連續7年居第一位，又依據行政院衛生署「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，濫用藥物尿液檢出愷他命陽性數，呈現逐年倍增趨勢，濫用之族群以青少年為主，顯見愷他命濫用已成為國內重要公共衛生議題。另根據醫學研究顯示，濫用愷他命(Ketamine)將會產生耐受性及心理依賴性，造成過度性使用，不易戒除。此外濫用者會罹患慢性間質性膀胱炎，造成膀胱功能受損，使得膀胱容量變小、頻尿、小便變少、嚴重時還會使膀胱壁纖維化、變厚，導致不可逆性之後遺症，甚至必須進行膀胱重建手術，否則以後一輩子要包著尿布。

為增進民眾對濫用愷他命所致之身心危害有所瞭解，強化民眾對濫用愷他命危害之認知，避免民眾濫用愷他命，行政院衛生署食品藥物管理局已開發製作「不要K掉你的膀胱」海報、單張、藥物濫用實際案例探討手冊等文宣品，以愷他命連續施用會引起泌尿系統相關疾病實際案例故事，提醒民眾遠離濫用藥物危害，告誡民眾瞭解愷他命對身體所造成之危害，同時教導民眾如何拒絕毒品。透過平面及電子媒體等管道，加強宣導濫用K他命的危害，如於桃園國際機場公益廣告燈箱，刊登「不要K掉你的膀胱」，以及電視託播、捷運月台液晶電





食品藥物管理署 Food and Drug Administration

視等通路，播放「膀胱水球篇」及「廁所人生篇」拒絕K他命系列宣導短片，透過影片生動說明，增進民眾對愷他命危害的認知。

針對年輕族群常使用之網路媒體，加強線上宣導，將愷他命等藥物濫用相關資訊，即時公開於「食品藥物消費者知識服務網\反毒資源館」，提供民眾便利之資訊查詢平台。此外衛生單位全體動員宣導愷他命濫用之危害，各衛生機關、公私立醫院利用跑馬燈等電子看板，登載「拉K一時、尿布一世」等毒品危害防制標語，適時提醒民眾勿因一時好奇而施用愷他命，結合民間團體辦理藥物濫用預防宣導活動，著重愷他命危害防制宣導及教導民眾拒絕毒品方法。跨部會合作辦理愷他命濫用防制宣導，如與法務部及教育部合作，辦理「戰毒紀」反毒宣導系列活動，多面向深化民眾反毒觀念及認清愷他命危害。

防制藥物濫用是一刻不容緩工作，加上年輕朋友常因受朋友慫恿或一時好奇，而嘗試濫用藥物，為維護青少年朋友健康，亟需更多民眾一起參與，認識濫用藥物所致之身心危害，並將此訊息傳達予更多青少年及民眾瞭解，共築防制網絡，期盼更多專業人士與民眾加入防制藥物濫用行列，一同打造健康無毒家園。

摘自：管制藥品簡訊第54期(網址：<http://www.fda.gov.tw/TC/PublishOtherMessage.aspx>)



食品藥物管理署


Food and Drug Administration

愷他命之風險管理

行政院衛生署食品藥物管理局 風險管理組

行政院衛生署於93年公告藥物尿液檢驗愷他命項目之閾值，並積極推動該項認可，迄今，共有台灣檢驗科技股份有限公司台北與高雄實驗室、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、詮昕科技股份有限公司、長榮大學毒物研究中心、中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心、三軍總醫院臨床病理科臨床毒藥物檢驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、正修科技大學等10家檢驗機構通過愷他命項目的認可檢驗，認可實驗室之詳細資訊，可於本局官網首頁<http://www.fda.gov.tw/upload/133/2012101215492974091.pdf>查詢。另目前尚有2家檢驗機構申請中。此外，本局提供愷他命之測試檢體，定期針對認可檢驗機構進行愷他命之績效監測，以確保其檢驗品質，未來亦將持續推動愷他命之項目認可，並加強監督愷他命純質淨重之檢驗，以符合司法體系之需要及擴充檢驗能量。

摘自：管制藥品簡訊第54期(網址：<http://www.fda.gov.tw/TC/PublishOtherMessage.aspx>)





食品藥物管理署 Food and Drug Administration


「拉K」毒害深！加強藥物濫用通報

食品藥物管理署 管制藥品組

每年的6月26日是「國際反毒日」，依據法務部統計資料顯示，自95年起，「愷他命」(K他命)緝獲量就高居全國首位，顯見藥物濫用嚴重影響國人身心健康。為了監測及瞭解國內藥物濫用情形，食藥署已建置「管制藥品濫用通報資訊系統」，鼓勵醫療院所及藥癮戒治機構，發現藥物濫用個案時請立即通報，並彙整各部會藥物濫用相關資料，做為政府藥物濫用防制政策之參考。

愷他命是第三級管制藥品，近年來常被濫用，研究顯示濫用愷他命的「拉K」行為，會影響人體泌尿系統，罹患慢性間質性膀胱炎，產生頻尿、血尿、小便疼痛，嚴重者甚至出現尿量減少、下腹部疼痛及腎功能不全等症狀，嚴重危害國人健康，必須加強管控。

食藥署已於104年3月27日請各縣市政府衛生局、台灣泌尿科醫學會、台灣腎臟科醫學會及台灣家庭醫學醫學會，加強愷他命濫用通報，藉此了解實際濫用人數及就醫情況。除了每月進行通報系統資料的流行病學分析外，食藥署也彙集全國濫用藥物尿液檢驗、司法單位的統計資料，涉嫌毒品及管制藥品案件的非尿液檢體檢驗、緝獲毒品等統計資料，彙編為「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」外，並進行年度資料統計分析，以呈現國內藥物濫用趨勢，月報及年報資





食品藥物管理署

Food and Drug Administration

料都會公布於食藥署網頁 (<http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=1578>) 供社會各界參考。

摘自：藥物食品安全週報第 510 期 (網址：<http://www.fda.gov.tw/tc/PublishOtherEpaper.aspx>)



“不要K掉你的膀胱”

長期濫用愷他命 (Ketamine)

會傷害膀胱功能，

使膀胱壁增厚容量變小，


出現頻尿、小便疼痛、血尿、

下腹部疼痛等症狀，

甚至須進行人工膀胱手術，

絕對不要輕忽其危害。

健康的膀胱



拉K一時，尿布一世

長期使用K他命



